

FI- Green Protect Liima-ansa Luumukääriäisille on tehokas feromonivahvisteinen pyydys, joka auttaa ennaltaehkäisemään toukkien esiintymistä luumuissa.

Käyttöohjeet:


1. Aseta kiinnikkeet niille tarkoitettuihin reikiin ansan yläreunaan. (kuva 2).
2. Taita toinen ansan laidoista ylös (kuva 3).
3. Poista liimapinnan suojapaperi liimalevystä ja aseta liimalevy ansan sisään tahmea puoli ylöspäin. (kuva 4).
4. Avaa hopeinen feromonipussi ja aseta punainen feromoninappi liimalevyn keskelle. Huom: pakkauksen pahvi on feromonin varastointia varten, eikä sitä aseteta ansaan (kuva 5).
5. Taita ansan toinen laita ylös. Laitojen nostaminen on tärkeää, jotta pikkulinnut eivät jää kiinni ansaan.
6. Ripusta ansa puuhun silmien korkeudelle ansan mukana toimitetuilla kiinnikkeillä.
7. Feromoni säilyy aktiivisena n. 6 viikkoa, jonka jälkeen liimalevy ja feromoni tulee vaihtaa uusiin. Uusi molemmat myös jos liimalevy täyttyy tätä ennen.

Tietoja luumukääriäisistä: Luumukääriäiset laskevat munansa luumupuiden kukintoihin ja toukat pilaavat hedelmät. Luumukääriäiset käyttävät mettä ravinnokseen ja lisääntyvät aikaisin keväällä. Ne laskevat munat pian kukinnan alkamisen jälkeen hedelmäpuun lehdille ja kukintoihin. Munat kuoriutuvat n. 8-14 päivän kuluessa. Toukka elää suojattua elämää hedelmän sisällä sitä syöden. Asutettu hedelmä mätänee hitaasti. Toukka kehittyä täyteen kokoon n. 4 viikossa, jonka jälkeen se etsii suojapaikan talvikuukausien ajaksi. Hedelmien sisällä jo asuvia toukkia ei voi torjua ulkopuolelta. Luumukääriäisen toukkia torjutaan tästä syystä ennaltaehkäisevästi koko kasvukauden ajan.

Luumukääriäisten torjunta: Aloita torjunta kun havaitset Green Protect Liima-ansassa luumukääriäisiä. Käytä luumukääriäisten poistamiseen seuraavia helppoja ja eco-ystävällisiä ohjeita:

1. Poista maahan tippuneet hedelmät. Älä kompostoi hedelmiä, vaan hävitä ne kotitalousjätteen mukana, jotta tuholaiset eivät palaa seuraavana keväänä.
2. Kääntelee maata puun ympäristä pudonneiden hedelmien poistamisen jälkeen.
3. Varmista, että Green Protect Luumukääriäisansa on asennettuna puuhun koko kasvukauden ajan.
4. Kun ansa on asennettu puuhun koko kasvukauden ajaksi on mahdollista reagoida ongelmaan nopeasti sen ilmaantuessa.

Sisältää: 1 ansa, 2 liimalevyä, 2 feromonihoukutinta, 2 kiinnikettä
Kysy lisätietoja tarvittaessa.



1.

2.

3.

4.

5.

EN- The Green Protect Plum Moth Trap is an effective pheromone trap which helps to prevent maggots/ worms in plums.

Direction of use

1. Insert the two wires into the holes in the top of the trap (see image 2)
2. Fold up one side of the trap (see image 3)
3. Remove the protective paper from the glueboard and place the glueboard inside the trap, on the base with the sticky side up (see image 4)
4. Open the silver bag containing the red pheromone and position it in the middle of the glueboard. *Note: The cardboard in the bag must not be used, this is a preservative item (see image 5)*
5. Fold up the other end of the trap. By folding up both sides of the trap, you are reducing the chance of birds being caught
6. Hang the assembled trap in the tree at approximately eye level – using the two inserted wires in the top of the trap

The pheromone will remain active for up to 6 weeks, after this time, the glueboard and pheromone should be replaced. Alternatively, if the glueboard becomes full, you should replace both the board and pheromone.

About plum moths: Plum moths lay their eggs within the flower buds of plum trees therefore spoiling the fruit with their larvae. Plum moths feed on nectar and breed early in the spring months. Shortly after the trees flower, the plum moths lay their eggs on the fruit tree's leaves and within the flowers. The eggs hatch after 8-14 days and the larvae emerge. The larvae live protected inside the fruit, where they feed on the cores. The infested fruit is filled with larval excrement which boosts the degradation process and the fruit slowly rots. The larvae are fully developed after approximately 4 weeks and will then seek out an appropriate location to live over the winter months. Larvae which is already present inside fruit, cannot be controlled. Future larvae infestations must be controlled through preventative measures which need to take place throughout the entire season.


Prevention of plum moths: When your Green Protect Plum Moth Trap has detected the presence of plum moths, you may need to implement measures to prevent them. To prevent pests from your plum tree you can use the below simple, eco-friendly methods:

1. Remove of fruit from the ground. It would be advised to put this fruit in the waste bin, rather than on a compost pile to avoid the pest returning the following year
2. After removing the fruit from the ground, till the soil under the tree by digging, stirring or overturning
3. Ensure you have the Green Protect Plum Moth Trap positioned in the tree all summer to increase monitoring opportunities
4. The trap should hang throughout the summer. This allows you to monitor any occurrence and take action as soon as the problem arises

Contains: Contain: 1 trap, 2 glueboards, 2 pheromones, 2 wires. Active: 6 weeks.

This product is classed as a monitoring device.

For more advice, please contact us.



1.

2.

3.

4.

5.

FR- Le Piège à Carpacaps Green Protect est un piège à phéromones efficace pour empêcher la présence de verres dans les prunes.

Instructions:

1. Insérez les deux fils de fer dans les trous au sommet du piège (voir image 2)
2. Dépliez un côté du piège (voir image 3)
3. Retirez le film protecteur de la plaque de glu et positionnez la plaque de glu à l'intérieur du piège, sur sa base avec le côté collant vers le haut (voir image 4)
4. Ouvrez le sachet argenté contenant le phéromone rouge et positionnez-le au milieu de la plaque de glu. *Remarque: Le carton du sachet ne doit pas être utilisé, il s'agit d'un conservateur (voir image 5)*
5. Dépliez l'autre côté du piège. En dépliant les deux côtés du piège, vous réduisez les chances de piéger les oiseaux
6. Suspendez le piège assemblé dans l'arbre à hauteur de regard - en utilisant les deux fils de fer au sommet du piège

Le phéromone restera actif jusqu'à 6 semaines, après cette période, la plaque de glu et le phéromone devront être remplacés. Alternativement, si la plaque de glu est pleine, vous devrez remplacer la plaque et le phéromone.

Au sujet des carpocapses des prunes: Les carpocapses des prunes pondent leurs oeufs dans les boutons floraux des pruniers, souillant ainsi le fruit de leur larve. Les carpocapses se nourrissent du nectar et se reproduisent tôt durant les mois estivaux. Les oeufs éclosent après 8 à 14 jours, puis la larve émerge. Les larves vivent protégées à l'intérieur du fruit, où elles se nourrissent du trognon. Le fruit infesté est rempli d'excrément larvaire, ce qui accélère le processus de dégradation, le fruit pourrit alors lentement. Les larves sont complètement développées après environ 4 semaines, après quoi elles se mettent à chercher un endroit approprié pour survivre aux mois d'hiver. Les larves déjà présentes dans le fruit ne peuvent pas être contrôlées. Les futures infestations de larves doivent être contrôlées via des mesures préventives qui devront prendre place au long de toute la saison.

Prévention des carpocapses dans les pommes et les poires: Lorsque votre Piège à Carpacaps des Prunes Green Protect a détecté la présence de carpocapses, vous devrez peut-être prendre des mesures de prévention. Afin d'empêcher ce nuisible d'infester vos poiriers et pommiers, vous pouvez utiliser les méthodes simples et écologiques ci-dessous:

1. Retirez les fruits sur le sol. Il est recommandé de mettre ces fruits dans une poubelle, plutôt que dans le compost afin d'empêcher le retour du nuisible l'année suivante
2. Après avoir retiré les fruits du sol, labourez le sol sous l'arbre en creusant, retournant et mélangeant la terre
3. Assurez-vous d'avoir un Piège à Carpacaps des Prunes Green Protect positionné dans l'arbre tout l'été afin d'augmenter les opportunités de contrôle
4. Le piège devra être suspendu tout au long de l'été. Cela vous permettra de contrôler la présence de carpocapses et de prendre des mesures si un problème surgit

Contient: 1 piège, 2 plaques de glu, 2 phéromones, 2 fils de fer. Actif: 6 semaines.

Ce produit est classé comme dispositif de contrôle.

Pour plus de conseils, s'il vous plaît contactez-nous.

DE- Die Pflaumenwicklerfalle von Green Protect ist eine wirkungsvolle Pheromonfalle, die hilft, Würmer in Pflaumen zu verhindern.

Gebrauch

1. Stecken Sie die beiden Drähte in die Löcher oben in der Falle (siehe Abbildung 2)
2. Klappen Sie eine Seite der Falle hoch (siehe Bild 3)
3. Entfernen Sie das Schutzpapier von der Klebefolie und legen Sie die Klebefläche mit der klebrigen Seite nach oben auf den Boden (siehe Abbildung 4)
4. Öffnen Sie den silbernen Beutel mit dem roten Pheromon und legen Sie ihn in die Mitte der Klebefläche. *Hinweis: Der Karton im Beutel darf nicht verwendet werden, dies ist ein Konservierungsmittel (siehe Abbildung 5)*
5. Klappen Sie das andere Ende der Falle hoch. Durch das Hochfalten beider Seiten der Falle verringern Sie die Wahrscheinlichkeit, dass Vögel gefangen werden
6. Hängen Sie die montierte Falle in etwa auf Augenhöhe in den Baum ein - mit den zwei Drähten oben in der Falle

Das Pheromon bleibt bis zu 6 Wochen aktiv, danach sollten Klebefläche und Pheromon ersetzt werden. Wenn die Klebefläche voll ist, sollten Sie sowohl die Platte als auch das Pheromon ersetzen.

Allgemeine Fakten zu Pflaumenwicklern: Pflaumenwickler legen ihre Eier in den Blütenknospen der Pflaumenbäume ab und verderben die Frucht mit ihren Larven. Pflaumenwickler ernähren sich von Nektar und brüten im Frühjahr. Kurz nachdem die Bäume blühen, legen die Pflaumenwickler ihre Eier auf die Blätter des Obstbaumes und in die Blüten.

Die Larven schlüpfen nach 8-14 Tagen aus den Eiern. Die Larven leben geschützt im Inneren der Frucht, wo sie sich von den Kernen ernähren. Die befallene Frucht füllt sich mit Larvenkot, der den Zersetzungsprozess fördert, so dass die Frucht langsam verfault. Die Larven sind nach ca. 4 Wochen voll entwickelt und suchen sich einen geeigneten Lebensraum für die Wintermonate.

Larven, die bereits in der Frucht vorhanden sind, können nicht bekämpft werden. Zukünftiger Larvenbefall muss durch vorbeugende Maßnahmen, die während der gesamten Jahreszeit stattfinden, bekämpft werden.

Verhinderung von Pflaumenwicklern: Wenn Ihre Pflaumenwicklerfalle von Green Protect das Vorhandensein dieser Insekten erkannt hat, müssen Sie möglicherweise Gegenmaßnahmen ergreifen. Um Schädlinge von Pflaumenbäumen fernzuhalten, können Sie die folgenden einfachen, umweltfreundlichen Methoden anwenden:

1. Gefallene Früchte vom Boden aufsammeln. Es ist ratsam, diese Früchte in den Abfalleimer und nicht auf den Komposthaufen zu werfen, um zu verhindern, dass der Schädling im folgenden Jahr zurückkehrt
2. Nach Entfernen der Früchte vom Boden, die Erde unter dem Baum umgraben
3. Die Pflaumenwicklerfalle von Green Protect sollte möglichst den ganzen Sommer über im Baum hängen, um die Überwachung zu verbessern
4. Die Falle sollte den ganzen Sommer im Baum hängen. So können Sie jeglichen Befall überwachen und bei Auftreten des Problems sofort eingreifen

Enthält: 1 Falle, 2 Klebeflächen, 2 Pheromone, 2 Drähte. Aktiv: 6 Wochen.

Dieses Produkt ist als Überwachungsgerät klassifiziert.

Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Beratung.

IT-La trappola per tignola delle susine Green Protect è un'efficace trappola a feromoni che aiuta a prevenire la comparsa di questo lepidottero.

Istruzioni per l'uso

1. Inserire i due fili nei fori della parte superiore della trappola (vedere Figura 2)
2. Ripiegare un lato della trappola (vedere Figura 3)
3. Rimuovere la pellicola protettiva dalla tavoletta adesiva e posizionarla all'interno della trappola, con il lato adesivo verso l'alto (vedere Figura 4)
4. Aprire la bustina argentata contenente il feromone rosso e posizionarlo al centro della tavoletta adesiva. *Nota: La tavoletta in cartone nella bustina non deve essere impiegata; si tratta esclusivamente di un apposito elemento preservante del feromone (vedere Figura 5)*
5. Ripiegare l'altra estremità della trappola. Ripiegando entrambi i lati della trappola, si riducono le possibilità di catturare eventuali uccelli
6. Appendere la trappola assemblata all'albero all'altezza degli occhi, approssimativamente, impiedendo i due fili inseriti nella parte superiore della trappola

Il feromone rimarrà attivo per un massimo di 6 settimane; successivamente, la tavoletta adesiva e il feromone dovranno essere sostituiti. In alternativa, se la tavoletta adesiva si riempie, sostituire sempre sia la tavoletta che il feromone.

Informazioni sulla tignola delle susine: La tignola delle susine depone le uova all'interno dei bulbi dei fiori della susina, rovinando il frutto con le larve. La tignola delle susine si nutre del nettare e si riproduce nei mesi primaverili. Subito dopo la fioritura dell'albero, la tignola delle susine depone le uova sulle foglie dell'albero e all'interno dei fiori.

Le uova si schiudono dopo 8-14 giorni e le larve fuoriescono. Le larve vivono protette all'interno del frutto, dove si nutrono dei noccioli. Il frutto infestato riempito con gli escrementi di larva accelera il processo di degrado, con conseguente marcitura del frutto. Le larve sono pienamente sviluppate dopo circa 4 settimane e cercano un habitat appropriato per sopravvivere nel corso dei mesi invernali.

Le larve che sono già presenti all'interno del frutto non possono essere tenute sotto controllo. Le infestazioni future da larve devono essere controllate tramite misure preventive messe in atto nel corso dell'intera stagione.

Prevenire la presenza della tignola delle susine: Quando la trappola per tignola delle susine Green Protect ha rimarcato la presenza di questo insetto, potrebbe essere necessario mettere in atto delle misure per eliminarlo. Per prevenire l'infestazione al proprio albero, è possibile adottare i metodi indicati di seguito, semplici e rispettosi dell'ambiente:

1. Rimuovere i frutti dal terreno. Si consiglia di gettare questi frutti nel cestino dei rifiuti piuttosto che aggiungerli al mucchio di terriccio, al fine di evitare la ricomparsa del parassita infestante l'anno successivo
2. Dopo aver tolto i frutti dal terreno, lavorare il suolo sotto l'albero scavando, movimentando o rivoltando
3. Assicurarsi di aver collocato la trappola per tignola delle susine Green Protect sull'albero per tutta l'estate al fine di aumentare le possibilità di monitoraggio
4. La trappola deve restare appesa tutta l'estate. Ciò consente di monitorare eventuali ritorni e intervenire tempestivamente non appena il problema si ripropone

Contenuto: 1 trappola, 2 tavolette adesive, 2 feromoni, 2 fili. Durata: 6 settimane.

Questo prodotto è classificato come dispositivo di monitoraggio.

Per ulteriori consigli, rivolgersi direttamente alla nostra azienda.

ES- La trampa para polilla de la ciruela Green Protect es una trampa de feromonas eficaz que ayuda a prevenir la presencia de gusanos en las ciruelas.

Instrucciones de uso

1. Introduzca los dos alambres por los agujeros de la parte superior de la trampa (figura 2)
2. Doble hacia arriba un lado de la trampa (figura 3)
3. Quite el papel protector de la lámina adhesiva y colóquela dentro de la trampa, en la base, con la cara adhesiva hacia arriba (figura 4)
4. Abra el envoltorio plateado que contiene el difusor de feromonas rojo y colóquelo en medio de la lámina adhesiva. *Nota: El cartón en el envoltorio no debe utilizarse, se trata de un elemento para proteger el producto (figura 5)*
5. Doble hacia arriba el otro lado de la trampa. Al doblar hacia arriba ambos lados de la trampa, se reduce la probabilidad de que puedan quedar pájaros atrapados
6. Cuelgue la trampa montada en el árbol, aproximadamente a la altura de los ojos; utilice para ello los dos alambres en la parte superior de la trampa

El difusor de feromonas estará activo durante un máximo de 6 semanas; pasado ese tiempo, es necesario sustituir la lámina adhesiva y el difusor de feromonas. Por otra parte, si la lámina adhesiva se llena, es necesario sustituir tanto la lámina como el difusor de feromonas.

Sobre las polillas de la ciruela: Las polillas de la ciruela ponen sus huevos dentro los capullos de los ciruelos, con lo que la fruta se echa a perder por las larvas. Las polillas de la ciruela se alimentan de néctar y se reproducen al comienzo de la primavera. Poco después de florecer los ciruelos, las polillas de la ciruela ponen sus huevos en las hojas y dentro de las flores de los árboles frutales.

Los huevos eclosionan entre 8 y 14 días después y salen las larvas. Las larvas viven protegidas dentro de la fruta, donde se alimentan del corazón. La fruta infestada se llena de deyecciones de las larvas, lo que fomenta su descomposición, y la fruta se pudre lentamente. Las larvas terminan su desarrollo después de aproximadamente 4 semanas y entonces buscan otro lugar adecuado para vivir durante los meses de invierno.

Las larvas que ya se encuentran dentro de la fruta no se pueden controlar. Las infestaciones futuras de larvas han de controlarse mediante medidas preventivas, que han de llevarse a cabo durante toda la estación.

Prevención de polillas de la ciruela: Cuando su trampa para polillas de la ciruela Green Protect ha detectado la presencia de polillas de la ciruela, es posible que tenga que tomar medidas para prevenirlas. Para evitar que esta plaga afecte a su ciruelo, puede utilizar los siguientes métodos, sencillos y respetuosos con el medio ambiente:

1. Retire la fruta del suelo. Es aconsejable que tire esa fruta a la basura, en lugar de ponerla en una pila de compost, para evitar que la plaga vuelva el año siguiente.
2. Después de retirar la fruta del suelo, ha de labrar la tierra bajo el árbol, bien cavando o removiendo.
3. Asegúrese de tener una trampa para polillas de la ciruela Green Protect en el árbol durante todo el verano para tener más posibilidades de detectarlas
4. La trampa debe estar colgada durante todo el verano. Esto le permite detectar la presencia y tomar medidas tan pronto como haya algún problema.

Contiene: 1 trampa, 2 láminas adhesivas, 2 difusores de feromonas, 6 semanas

Activa durante: 2 meses.

Puede consultar más información en el folleto que se adjunta.

Este producto se clasifica como dispositivo de detección.

NL- De Green Protect-Pruimenmotval is een effectieve feromoonval die helpt bij de preventie van larven in pruimen.

Gebruiksaanwijzing:

1. Stop de twee draden in de gaten aan de bovenkant van de val (zie foto 2)
2. Vouw aan één zijde de lip van de bodemplaat omhoog (zie foto 3)
3. Verwijder het plastic en de papieren bescherm laag van de kleefplaat en plaats de kleefplaat in de val, op de bodem met de plakkende kant naar boven (zie foto 4)
4. Maak het zilveren zakje met het rode feromoon open en plaats deze in het midden van de kleefplaat. *Opmerking: Het karton in de zak mag niet worden gebruikt, het bevat een conserveermiddel (zie figuur 5)*
5. Vouw de andere zijde van de bodemplaat van de val naar binnen. Door het naar binnen vouwen van beide kanten van de val, verlaagt u de kans om vogels te vangen
6. Hang de gemonteerde val op ongeveer oogniveau in de boom, met behulp van de twee draden die bovenaan in de val zijn bevestigd

Het feromoon is tot ongeveer 6 weken actief. Na deze periode moeten de kleefplaat en het feromoon worden vervangen. Eventueel kunt u zowel de plaat als het feromoon vervangen als de kleefplaat vol is.

Over pruimenmotten: Pruimenmotten leggen hun eieren in de bloemknoppen van pruimenbomen en tasten daarom het fruit aan met hun larven. Pruimenmotten leven van nectar en leggen vroeg in het voorjaar hun eitjes. Kort nadat de bomen gaan bloeien, leggen de pruimenmotten hun eitjes op de bladeren van de fruitbomen en in de bloesems.

Na 8-14 dagen komen de larven uit hun eitjes. De larven leven beschermd in de vrucht waar ze leven van de pitten. De aangetaste vrucht wordt gevuld met de uitwerpselen van de larven die het afbraakproces versnellen en de vrucht gaat langzaam rotten. Na ongeveer 4 weken zijn de larven volledig ontwikkeld en gaan ze op zoek naar een geschikte plek om te overwinteren.

Larven die zich al in de vrucht bevinden kunnen niet worden bestreden. Toekomstige larvenplagen moeten worden bestreden door middel van preventieve maatregelen die gedurende het hele seizoen moeten worden ondernomen.

Preventie van pruimenmotten: Wanneer uw Green Protect-Pruimenmotval de aanwezigheid van pruimenmotten heeft signaleerd, kunt u aanvullende maatregelen treffen om ze te voorkomen. Met behulp van de onderstaande eenvoudige, milieuvriendelijke methoden kunt u voorkomen dat er een plaag ontstaat in uw pruimenboom:

1. Verwijder het gevallen fruit van de grond. Het wordt geadviseerd dit fruit in de afvalbak te gooien en niet op de composthoop. Dit is om te voorkomen dat de plaag volgend jaar weer terugkomt.
2. Na het verwijderen van het fruit van de grond, bewerkt u de aarde door deze om te spitten of om te ploegen
3. Zorg ervoor dat u de Green Protect-Pruimenmotval de hele zomer in de bomen hangt om de controleerbaarheid te verhogen
4. Als u de val de hele zomer in de bomen laat hangen geeft dit u de mogelijkheid de aanwezigheid van ongedierte te monitoren en actie te ondernemen zodra er problemen ontstaan


Inhoud: 1 val, 2 kleefplaten, 2 feromonen, 2 draden. Werkingsduur: 6 weken.

Dit product is bestemd voor monitoringsactiviteiten.


Neem voor meer advies contact met ons op.




1.



2.



3.




4.




5.



1.




2.



3.



4.



5.



DK- Green Protect Blommeviklerfælde er en effektiv limfælde med feromon, der hjælper dig i forebyggelses-
en af orm i blommer. Én fælde dækker en lille parcellusgrund.

Brugsanvisning


1. Vær sikker på at pakken indeholder alle dele: 1 hus, 2 limplader, 2 feromoner og 2 wire
2. Sæt de to wire i to af hullerne i toppen af huset (jf. billede 2)
3. Fold den ene side op – de to flapper skal igennem de aflange huller i siderne (jf. billede 3)
4. Fjern det beskyttende papir fra limpladen og læg limpladen ind i den åbne side af huset, med den klistrede flade opad (jf. billede 4)
5. Åbn sølvposen med feromonet og hæld denne på limpladen. *OBS! Papstykket i posen skal ikke anvendes (jf. billede 5).* Fold nu den anden side op af huset
6. Hæng fælden op i træet, ca. i øjenhøjde, ved hjælp af de to wire i toppen af huset
7. Feromonet er aktivt i op til 6 uger, herefter udsiftes limplade og feromon

Om blommeviklere (orm i blommer): Larverne i dine frugttræer kommer fra et lille sommerfugle-lignende insekt, kaldet en vikler. Viklerne ernærer sig af nektar og formerer sig tidligt i forårsmånederne. Kort tid efter træets blomstring, lægger viklerne deres æg på bladene og i blomsterne. Æggene klækkes efter 8-14 dage, ud kommer larverne, som straks vil søge efter en frugt, de kan leve i. Larverne lever derefter beskyttet inde i frugten, hvor de ernærer sig af kernehuset. De angrebne frugter fyldes med larvenes ekskrementer, hvilket sætter gang i en nedbrydningsproces og frugten derved langsomt rådner. Larven er færdigudviklet i løbet af ca. 4 uger, og vil hernæst søge plads til overvintring. Orm inde i frugt kan ikke bekæmpes. Når de først er inde i frugten, har de allerede lavet skaden. Et angreb skal forebygges – men forebyggelsen foregår på flere måder, og forebyggelsen skal foregå hele sæsonen. På denne måde forebygger du ikke kun denne sæsons orm, men en vedvarende indsats forebygger også orm næste år.

Hvordan slipper du for orm i æblerne? Når du ved hjælp af Green Protect Blommeviklerfælde har konstateret forekomsten af viklere, kan du selv gøre en indsats for at undgå, at de finder vej ind i frugten. Det er vanskeligt, men også uheldigsmæssigt, at benytte insektgift i sine spiselige afgrøder, så derfor foreslår vi følgende metoder:

1. Brug Green Protect Blommeviklerfælde. Ved brug af en god fælde kan du hurtigt vurdere om en forebyggende indsats er nødvendig. Ved fangst af små, brune sommerfuglelignende insekter bør en forebyggende indsats iværksættes
2. Brug nytte dyr. Snyltehepse er gode til formålet, men der skal sættes ind, når du opdager at viklerne er der. Snyltehepse kan bestilles hos din planteskole eller på nettet
3. Fjern angrebne og nedfaldne frugter. Sørg for at alle nedfaldne frugter samles op og afskaffes igennem hele sæsonen. Undgå at lægge dem i en kompostbunke i nærheden. Smid hellere i skraldespanden, så er du sikker på, at eventuelle larver ikke overvintrer
4. Efter høst kultiveres jorden under og omkring træet. Dette forhindrer larverne i at overvintrere lige under træet
5. Lad fælden hænge i hele sommerperioden. På denne måde kan du holde øje med forekomsten, og gøre en indsats, så snart problemet opstår

Indeholder: 1 fælde, 2 limplader, 2 feromoner, 2 wire. Aktiv: 2 måneder
Dette produkt er klassificeret som en overvågningsenhed.
For flere råd, kontakt os gerne.



1.

2.

3.

4.

5.



SE- Green Protect Plommonvecklarfälla är en effektiv limfälla med feromon som hjälper dig att förebygga
mask i plommon. En fälla täcker en yta motsvarande grunden till en liten enfamiljsvilla.

Brugsanvisning


1. Kontrollera att paketet innehåller alla delar: 1 hus, 2 limplattor, 2 feromoner och 2 wire
2. Tråd wren genom hålen högst uppe på huset (jfr bild 2)
3. Vik upp ena sidan – de två flikar ska igenom de två avlånga hålen i sidorna. (jfr bild 3)
4. Ta bort skyddspappret från limplattan och lägg in limplattan i den öppna sidan med den klistrande delen uppåt (jfr bild 4)
5. Öppna silverpåsen innehållande feromonet och häll ut denna på limplattan. *OBS! Pappersbiten i påsen ska inte användas (jfr bild 5).* Vik nu upp andra sidan och fäst flikarna i hålen
6. Häng upp fällan i trädet ca. i ögonhöjd med de två wire överst på huset
7. Feromonet är aktivt i upp till 6 veckor, och sedan byter man limplatta och feromon

Om plommonvecklare (mask i plommon): Larverna i dina fruktträd kommer från en liten fjärilsli-knande insekt som kallasvecklare. Vecklarna livnär sig på nektar och förökar sig tidigt på våren. En kort tid efter trädets blomning läggervecklarna ägg på bladen och i blomsterna. Äggen kläcks efter 8-14 dagar och ut kryper larverna, som direkt börjar leta efter en frukt att leva i. Larverna lever sedan skyddade inne i frukten, där de livnär sig av kärnhuset. De angripna frukterna fylls med larvernas spillning, vilket sätter igång en nedbrytningsprocess och frukten ruttnar långsamt. Larven är färdigutvecklad inom ca. 4 veckor och letar sedan upp en plats att övervintra på. Mask inuti frukt kan inte bekämpas. Om masken är inuti frukten, är skadan redan skedd. En maskattack måste förhindras - men förebyggande sker på flera olika sätt, och förebyggande måste även ske under hela säsongen. På detta sätt förebygger du inte enbart mask i den nuvarande säsongen, men oförminskade ansträngningar genom hela säsongen förhindrar även mask nästa år.

Förebyggande avvecklare i plommon: När du med hjälp av Green Protect Plommonvecklarfälla har konstaterat att det finnsvecklare, kan du själv göra en insats för att bli av med dem. Det är riskabelt, men också olämpligt, att använda insektgift på ätbara grödor, så därför föreslår vi följande metoder:

1. Använd Green Protect Plommonvecklarfälla. Med hjälp av en bra fälla, kan du snabbt och enkelt bedöma om förebyggande åtgärder behövs. Fångas små, bruna fjärilsliknande insekter i fällan, bör du omedelbart gå i gång med de förebyggande åtgärder
2. Använd nyttodjur. Parasitsteklar är bra till ändamålet, men de måste sättas in när du upptäckervecklarna. Parasitsteklar kan beställas av din plantskola eller på nätet
3. Plocka angripna och nedfallna frukter. Samla ihop nedfallna frukter och släng dem under hela säsongen. Undvik att lägga dem i en kompost nära fruktträden. Kasta dem hellre i sophinken, så att du är säker på att eventuella larver inte övervintrar
4. Efter hösten kultiveras jorden runt trädet. Detta förhindrar att larverna övervintrar precis under trädet
5. Låt fällan hänga hela sommaren. På så sätt kan du hålla ett öga på förekomsten och göra en insats så snart problemet uppstår

Förpackningen innehåller: 1 hus, 2 limplattor, 2 feromoner och 2 wire. Aktiv: 2 månader.
Denna produkt är klassad som en övervakningsanordning.
Kontakta oss gärna om du behöver fler råd.



1.

2.

3.

4.

5.

PL- Pułapka Na Owocówkę Śliwkóweczkę Green Protect to skuteczna pułapka feromonowa, która
pomaga w zapobieganiu ćmom w śliwkach.

Sposób użytkowania:

1. Włóż dwa przewody do otworów w górnej części pułapki (patrz rysunek 2)
2. Złóż jedną stronę pułapki (patrz rysunek 3)
3. Usuń papier ochronny z płyty klejącej i umieść płytę klejącą wewnątrz pułapki na podstawie, lepką stroną do góry (patrz rysunek 4)
4. Otwórz srebrną torebkę zawierającą czerwony feromon i umieść ją na środku kleju.
Uwaga: Tekstury w worku nie wolno używać, jest to środek konserwujący (patrz rysunek 5)
5. Złóż drugi koniec pułapki. Składając obie strony pułapki, zmniejszasz ryzyko złapania ptaków
6. Zawieś zmontowaną pułapkę na drzewie na wysokości oczu - za pomocą dwóch włożonych drutów w górnej części pułapki

Feromon pozostanie aktywny przez okres do 6 tygodni, po tym czasie należy wymienić klej i feromon. Jeśli płyta klejąca zapelni się, należy wymienić płytkę i feromon wcześniej.

O ćmach śliwkowych:

Ćmy śliwkowe składają jaja w pąkach kwiatowych śliwy, co psuje owoce. Motyle śliwkowe żywią się nektarem i rozmnażają się wczesną wiosną. Krótko po zakwitnięciu drzew, ćmy składają jaja na liściach drzewa owocowego i wewnątrz kwiatów. Jaja wylęgają się po 8-14 dniach i pojawiają się larwy. Larwy żyją chronione wewnątrz owocu, gdzie żywią się rdzeniami. Zażony owoc jest wypełniony odchodami larwalnymi, co przyspiesza proces rozkładu, a owoce wolno gniją. Larwy są w pełni rozwinięte po około 4 tygodniach, a następnie szukają odpowiedniego miejsca do życia w miesiącach zimowych. Larwy, które są już obecne w owocach, nie mogą być kontrolowane. Przyszłe inwazje larw muszą być kontrolowane za pomocą środków zapobiegawczych, które muszą odbywać się przez cały sezon.

Zapobieganie ćmom śliwkowym: Gdy twoja pułapka na ćmy Green Protect wykryła obecność ćm śliwkowych, być może trzeba będzie zastosować środki, aby im zapobiec. Aby zapobiec szkodnikom z drzewa śliwkowego, możesz skorzystać z poniższych, prostych i przyjaznych dla środowiska metod:

1. Usuń owoce z ziemi. Zaleca się umieszczenie ich w koszu na śmieci, nie w kompostie, aby uniknąć powrotu szkodnika w następnym roku
2. Po usunięciu owoców z ziemi, przekop glebę pod drzewem
3. Upewnij się, że pułapka śliwkowa jest umieszczona w drzewie przez całe lato, aby zwiększyć możliwości monitorowania
4. Pozwala to monitorować każde zdarzenie i podejmować działania natychmiast po pojawieniu się problemu

Zawiera: 1 pułapkę, 2 płyty klejące, 2 feromony, 2 przewody. Aktywny: 6 tygodni.
Ten produkt jest klasyfikowany jako urządzenie monitorujące.
Aby uzyskać więcej porad, skontaktuj się z nami.